



**N**ew Combination based on Clinical Experience<sup>1-5</sup>

**I**mproved Glycemic Control<sup>4,5</sup>

**C**onvenient with Relatively Small-sized Tablet<sup>1,6,7</sup>

**E**conomically Affordable<sup>1,8</sup>


# Improved Glycemic Control<sup>4,5</sup>



✓ 우수한 혈당강하 효과를 기대할 수 있는 Improved Glycemic Control 제미다파<sup>®</sup>정으로 2형 당뇨병 환자를 NICE하게 관리하세요!<sup>4,5</sup>



다파글리플로진과 메트포르민<sup>†</sup>을 복용하는 환자군에서 제미글로<sup>®</sup>정 추가 시, 52주까지 지속적인 혈당강하 효과를 보였습니다.<sup>4,5</sup>



Data at each visit are presented as LS Mean.

<sup>\*</sup>The upper limit for '95% CI of LS mean value' was below '0'. <sup>\*\*</sup>p<0.0001 vs. Placebo. <sup>†</sup>메트포르민 ≥ 1,000 mg/day.

<sup>#</sup>Patients were randomized to Gemigliptin 50 mg or placebo for 24 weeks. At 24-week, placebo were switched to Gemigliptin 50 mg and treatments were continued until week 52.

CI, confidence interval; Dapa, dapagliflozin; LS, least-squares; Met, metformin.



제미다파<sup>®</sup>정은 제미글립틴 50 mg과 다파글리플로진 10 mg의 복합제로 하루 한 알 복용합니다.<sup>1</sup>

| 제품명   | 제미다파 <sup>®</sup> 정 (Zemidapa <sup>®</sup> Tab.)                                                                                                                                                       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 제품사진  |   8.1mm<br>8.1mm<br>두께: 3.7 mm |
| 보험약가  | 940원 / 1T (2023.05.01. 기준)                                                                                                                                                                             |
| 성분/용량 | Gemigliptin(제미글립틴) 50 mg /<br>Dapagliflozin(다파글리플로진) 10 mg                                                                                                                                             |

※ 제품 사진은 실제 정제 크기와 동일합니다.

MFDS, Ministry of Food and Drug Safety.

References 1. MFDS, Pharmaceutical Integrated intelligence system (<https://nedrug.mfds.go.kr>). 2. Data on file, LG Chem. 3. SGLT-2 단일제 성분별 원약처방액 기준, UBIST sales data (As of 2022.01~2022.12). 4. Data on file, Clinical Phase III trial in Korea (Pivotal Study), LG-DPCL019 (2022), LG Chem. 5. Lee BW et al., (2022). Efficacy of Gemigliptin Add-on to Dapagliflozin and Metformin in Type 2 Diabetes Patients: A Randomized, Double-blind, Placebo-controlled Study (SOLUTION II) [Unpublished manuscript]. 6. US FDA Guidance for Industry : Size, Shape, and Other Physical Attributes of Generic Tablets and Capsules, Oct 2022. 7. Guillausseau PJ et al., Diabetes Metab. 2003;29(1):79-81. 8. 보건복지부 고시 제 2023-82호. (시행일: 2023.05.01)

제미다파<sup>®</sup> (제미글립틴/다파글리플로진) 50/10 mg (제품 출시일: 2023.04.08 / 제품의 Product Information 전문은 우측 QR 코드 참고할 수 있음)

[효능·효과] 이 약은 제미글립틴과 다파글리플로진의 병용투여가 적합한 제2형 당뇨병 환자의 혈당조절을 향상시키기 위해 식사요법 및 운동요법 보조제로 투여. [용법·용량] 이 약은 제미글립틴 50 mg과 다파글리플로진 10 mg을 투여하는 환자에게 식사와 관계없이 1일 1회 1정을 투여. 추정 사구체 여과율(eGFR)이 45 mL/min/1.73m<sup>2</sup> 미만인 경우에는 이 약의 투여는 권장되지 않음. 중증 간장애 환자 대상으로 이 약의 안전성과 유효성은 연구된 바 없음. [사용상 주의사항] 이 약의 주성분인 제미글립틴이나 다파글리플로진, 또는 첨가제에 대한 과민반응 병력이 있는 환자, 제1형 당뇨병 및 당뇨병성 케톤산증 환자, 갈락토오스 불내성, Lapp 유전 분해효소 결핍증 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애 환자, 투석중인 환자에게 금기. [이상반응] 메트포르민과 다파글리플로진에 제미글립틴을 24주간 추가 투여한 임상 시험에서 1% 이상의 환자에서 보고된 이상반응은 리파아제 증가, 만성위염, 어지러움, 요로감염, 기침, 당뇨병성 신장병증, 위염, 치은염, 대장염, 두드러기, 소화불량, 24주 이후 52주까지 연장하여 진행한 기간 (후반 28주동안 새롭게 확인된 이상반응 (인과관계 평가와 관계 없이 보고된 이상반응)은 고혈당증과 두통임 [제품 허가일 2022.06.21]).

[제조 및 판매원] (주) LG화학



※ 자세한 정보는 최신의 제품설명서 전문을 참고하시기 바라며, 홈페이지([www.lgchem.com](http://www.lgchem.com))에서도 확인하실 수 있습니다. [07795] 서울시 강서구 마곡중앙10로 70, LG사이언스파크 E14 | 고객센터 080-023-5757 | [www.lgchem.com](http://www.lgchem.com)



GEDA-BR-B005-01-MAY23